UJI EFEKTIVITAS AIR PERASAN JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) DALAM MENGHAMBAT PERTUMBUHAN JAMUR *Candida albicans*

Sukmawati¹, Toto Santoso^{2*}, Alda Miranti³

^{1,2,3}STIKes Muhammadiyah Kuningan

*E-mail : rav3nz46@gmail.com

ABSTRAK

Masalah yang sering terjadi di masyarakat adalah penyakit kandidiasis yang disebabkan oleh beberapa jamur salah satunya *Candida albicans*. Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) merupakan tanaman obat yang tumbuh subur di negara Indonesia. Salah satu kandungan utama dari jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) adalah flavonoid yang memberikan berbagai macam aktivitas farmakologi sebagai antifungi, antibakteri dan antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas air perasan jeruk nipis, (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) dalam menghambat pertumbuhan jamur *Candida albicans*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dilusi padat yaitu dengan cara menanam biakan suspensi jamur *Candida albicans* sebanyak 1 ml yang telah disesuaikan kekeruhannya dengan larutan standar Mc Farland 0.5 pada media SDA (*Sabouraud Agar Dexrose*) dengan penambahan air perasan jeruk nipis sebanyak 2 ml dengan konsentrasi 125%, 150%, 175% dan 200%. Di inkubasi selama 2-3 hari pada 37°C, dan diamati pertumbuhannya. Hasil dari pengamatan selama tiga hari menunjukkan bahwa air perasan jeruk nipis tidak efektif dalam menghambat pertumbuhan jamur *Candida albicans*, meskipun pada konsentrasi 175% dan 200% pertumbuhan jamur pada hari pertama sangat sedikit, tetapi pada hari kedua dan ketiga masih ada perluasan pertumbuhan jamur *Candida albicans*.

Kata Kunci: Antifungi, *Candida albicans*, Jeruk nipis

ABSTRACT

The problem that often occurs in the community is candidiasis caused by several fungi, one of which is *Candida albicans*. Lime (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) is a medicinal plant that thrives in Indonesia. One of the main ingredients of lime (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) is flavonoid which provides various kinds of pharmacological activities as antifungal, antibacterial and anticancer. This study aims to determine the effectiveness of lime juice (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) in inhibiting the growth of the fungus *Candida albicans*. The method used in this study is by solid dilution, namely by planting a suspension of *Candida albicans* fungus as much as 1 ml which has been adjusted for turbidity with standard Mc Farland 0.5 solution on SDA media (*Sabouraud Agar Dexrose*) with the addition of 2 ml lime juice with concentrations of 125%, 150%, 175% and 200%. Incubated for 2-3 days at 37°C, and observed growth. The results of observations for three days showed that lime juice was not effective in inhibiting the growth of *Candida albicans* fungus, although at concentrations of 175% and 200% the growth of the fungus on the first day was very little, but on the second and third days there was still expansion of the growth of *Candida albicans*.

Keywords: Antifungal, *Candida albicans*, Lime

PENDAHULUAN

Masalah yang sering terjadi di masyarakat adalah penyakit kandidiasis yang disebabkan oleh beberapa jamur salah satunya *Candida albicans*. Hampir disetiap tubuh kita mengandung jamur *Candida albicans* termasuk di daerah mukosa mulut, kulit, saluran cerna, dan alat kelamin, namun adanya jamur ini tidak menimbulkan keluhan yang berarti. *Candida albicans* merupakan flora normal dalam tubuh manusia, namun bila dalam jumlah yang berlebih akan menjadi patogen (oportunistik). Jamur *Candida albicans* dapat tumbuh dengan baik di tempat yang lembab (Maimunah *et al.*, 2018).

Kandidiasis adalah penyakit jamur, yang bersifat akut atau subakut disebabkan oleh genus *Candida*, biasanya oleh spesies *Candida albicans* dan dapat mengenai mulut, vagina, kulit, kuku, bronki, atau paru, kadang-kadang dapat menyebabkan septikemia, endokarditis, atau meningitis (Rahayu Sawitri, 2019).

Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) adalah salah satu tanaman obat yang tumbuh subur di negara Indonesia. Salah satu kandungan utama dari jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) adalah flavonoid yang memberikan berbagai macam aktivitas farmakologi. Aktivitas farmakologi jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) diantaranya adalah antibakteri, antifungal, antioksidan, antikanker, sebagai pemutih gigi, larvasida nyamuk aedes aegypti, antikolesterol (Prastiwi *et al.*, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa perasan air buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% tidak mampu dalam menghambat pertumbuhan jamur *Candida albicans* (Maimunah *et al.*, 2018). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali apakah air jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) mampu menghambat pertumbuhan jamur *Candida albicans*, dengan konsentrasi diatas 100% dengan cara dilusi padat

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan yaitu Media SDA (*Sabouraud Dextrose Agar*), Air Perasan Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle), Isolat Jamur *Candida albicans*, Aquadest steril, NaCl 0.9%, BaCl 1%, H₂SO₄ 1%.

Cawan petri (ANUMBRA), Beaker glass (PYREX), Erlenmeyer (PYREX), Jarum ose, Pipet tetes, Pipet Volume, Tabung reaksi (PYREX), Rak tabung reaksi, Alumunium foil, Timbangan analitik (NEW TECH), Kapas, Batang pengaduk, Korek api, Lampu spiritus, Lap, Alat pemeras jeruk, Kertas saring, Autoklaf (HIRAYAMA), Inkubator (MEMMERT)

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksperimental, karena sampel dibuat dengan konsentrasi yang bervariasi. Sampel atau subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa air perasan jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) sebanyak 2 ml dengan konsentrasi 125%, 150%, 175%, dan 200%. Setiap variasi konsentrasi diujikan pada objek penelitian yaitu suspensi jamur *Candida albicans* yang telah disetarakan kekeruhannya dengan kekeruhan standar Mc Farland 0.5. Proses identifikasi penelitian ini meliputi penanaman jamur isolat murni pada media SDA (*Sabouraud Agar Dextrose*) dengan metode cawan tuang.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan bulan Desember 2020, dari awal perencanaan (penyusunan proposal) sampai dengan penyusunan laporan akhir dan pengumpulan data yang akan dilakukan pada bulan April 2021.

Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Muhammadiyah Kuningan.

PROSEDUR PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara steril dan aseptis. Sterilisasi alat-alat yang akan digunakan dengan autoklaf selama kurang lebih 15 menit pada suhu 121°C .

Peremajaan Jamur *Candida Albicans*

Peremajaan jamur *Candida albicans*, dilakukan dengan cara menanam isolat murni jamur *Candida albicans* pada media SDA, kemudian diinkubasi pada suhu 37°C , selama 24 jam.

Pembuatan Konsentrasi Air Perasan Jeruk Nipis

Pembuatan konsentrasi air perasan jeruk nipis yang digunakan dibuat sebanyak 2ml dengan perbandingan v/v.

Tabel 1. Tabel Pembuatan Konsentrasi Air Perasan Jeruk Nipis

	Air perasan Jeruk Nipis	Aquadest	Keterangan konsentrasi
A	1,25 ml	0,75 ml	125%
B	1,50 ml	0,50 ml	150%
C	1,75 ml	0,25 ml	175%
D	2,0 ml	-	200%

Pembuatan Media SDA (*Sabouraud Dextrose Agar*)

Timbang media SDA sebanyak 6,5 gram. kemudian masukkan ke dalam beaker glass, dilarutkan dengan 100 ml aquades, lalu panaskan diaduk sampai homogen dan mendidih selama kurang lebih 15 menit. Masukkan media kedalam erlenmeyer lalu tutup menggunakan kapas dan aluminium steril, kemudian sterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama kurang lebih 15 menit. Biarkan dingin dan untuk disimpan.

Pembuatan Larutan Standar Mc Farland 0,5

Larutan standar Mc Farland 0,5 sebanyak 10ml dibuat dengan mencampurkan 0,05 ml larutan BaCl_2 1% dengan 9,95 ml larutan H_2SO_4 1%, hingga didapat standar Mc Farland 0,5 dan setara dengan jumlah jamur $1,5 \times 10^8$ CFU/ml (Baterun Kunsah, 2016).

Pembuatan Suspensi *Candida albicans*

Mengambil satu ose isolat jamur *Candida albicans* dimasukkan pada tabung reaksi yang berisi 10ml NaCl 0.9%, kemudian homogenkan. Sesuaikan kekeruhan dengan larutan standar Mc Farland 0,5 secara visual.

Prosedur Pemeriksaan Daya Hambat Pertumbuhan Jamur *Candida albicans*

Suspensi jamur *Candida albicans* yang telah disesuaikan dengan larutan standar Mc. Farland 0.5 sebanyak 1 ml dituang kedalam cawan petri steril, tambahkan air perasan jeruk nipis dengan konsentrasi 125%, kemudian tambahkan media SDA (*Sabouraud Dextrose Agar*) cair steril, kemudian diputar membentuk angka 8 hingga homogen. Biarkan media dingin dan memadat, lakukan hal yang sama dengan penambahan air perasan jeruk nipis dengan konsentrasi 150%, 175%, dan 200%. Selanjutnya keempat cawan petri dimasukan kedalam inkubator untuk diinkubasi selama hari dengan suhu 37°C , dan diamati pertumbuhan yang setiap 24 jam.

Analisis Data

Analisis hasil uji anti jamur dilakukan dengan cara melihat pertumbuhan koloni jamur pada media SDA (*Sabouraud Dextrose Agar*) yang sudah ditambahkan air perasan jeruk nipis dengan konsentrasi yang berbeda-beda dan suspensi jamur *Candida albicans*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian Uji Efektivitas Air Perasan Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) dalam menghambat pertumbuhan jamur *Candida albicans* diketahui sebagai berikut :

Gambar 1. Gambar Hasil Pengamatan pada hari Pertama

Gambar 2. Gambar Hasil Pengamatan pada hari Kedua

Gambar 3. Gambar Hasil Pengamatan pada hari Ketiga

Gambar 4. Grafik pertumbuhan jamur *Candida albicans* selama 3 hari.

Menurut peneliti air perasan buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle) sebanyak 2 ml dengan masing-masing konsentrasi 125%, 150%, 175%, dan 200% telah diujikan dengan 1 ml suspensi jamur *Candida albicans* yang, ditanam pada media SDA dan diinkubasi selama 3 hari dengan suhu 37°C. Berdasarkan pengamatan selama tiga hari pada masing-masing konsentrasi, jamur *Candida albicans* masih tetap tumbuh, meskipun pada konsentrasi 175% dan 200% pertumbuhan jamur pada hari pertama sangat sedikit, tetapi pada hari kedua dan ketiga masih ada perluasan pertumbuhan jamur *Candida albicans*.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi aktivitas antimikroba adalah takaran inokulum, karena semakin besar inokulum bakteri maka kesensitifan organisme akan semakin rendah. Perbedaan konsentrasi disebabkan karena adanya perbedaan senyawa yang terkandung dalam air jeruk nipis (Razak *et al.*, 2013)

Konsentrasi air perasan jeruk nipis yang memungkinkan terjadinya interaksi optimal akan memberikan aktivitas optimal pula, tidak bergantung pada besar atau kecilnya konsentrasi air perasan tersebut. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin luas zona hambat berarti menunjukkan semakin tinggi efektivitas untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan jamur (Nurhasanah *et al.*, 2017).

Selain perbedaan senyawa yang terkandung di dalam air perasan buah jeruk nipis, pertumbuhan jamur tersebut dipengaruhi oleh perbedaan jumlah mikroba yang ditumbuhkan pada media, karena dalam 1 mL suspensi jumlah sel jamur belum tentu sama (Yuni, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa air perasan jeruk nipis tidak mampu dalam menghambat pertumbuhan jamur *Candida albicans*. Air perasan jeruk nipis sebanyak 2ml dengan masing-masing konsentrasi 125%, 150%, 175%, dan 200% telah diujikan dengan 1ml suspensi jamur *Candida albicans* yang ditanam pada media SDA dan diinkubasi selama 3 hari dengan suhu 37°C. Hasil pengamatan selama tiga hari pada masing-masing konsentrasi, jamur masih tetap tumbuh, meskipun pada konsentrasi 175% dan 200% pertumbuhan jamur pada hari pertama sangat sedikit, tetapi pada hari kedua dan ketiga masih ada perluasan pertumbuhan jamur *Candida albicans*.

REFERENSI

- Maimunah, E., F. A. and Rohhani, S. (2018) 'UJI EFEKTIFITAS AIR BUAH JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia*) DALAM MENGHAMBAT *Candida albicans*', (STIKes ICMe Jombang). Diploma thesis, STIKES Insan Cendekia Medika Jombang.
- Nurhasanah, N., Andrini, F. and Hamidy, Y. (2017) 'Aktivitas Antifungi Air Perasan Bawang Merah (*Allium ascalonicum* L.) Terhadap *Candida albicans* Secara In Vitro', *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 9(2), pp. 71–77.
- Penelitian, L., Pengabdian, D. A. N. and Surabaya, U. M. (2016) " Efektifitas Variasi Perasaan

Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans* Secara In Vitro
Efektifitas Variasi Perasaan Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Terhadap
Pertumbuhan *Candida albicans* Secara In Vitro .

Prastiwi, S. S. and Ferdiansyah, F. (2017) 'REVIEW ARTIKEL: KANDUNGAN DAN
AKTIVITAS FARMAKOLOGI JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia* s.)', *Farmaka*.

RAHAYU SAWITRI, D. (2019) *GAMBARAN Candida albicans PADA AIR KOLAM
RENANG DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019*. Poltekkes tanjungkarang.

Razak, A., Djamal, A. and Revilla, G. (2013) 'Uji Daya Hambat Air Perasan Buah Jeruk Nipis
(*Citrus aurantifolia* s.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus Aureus* Secara In
Vitro', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2(1), p. 05. doi: 10.25077/jka.v2i1.54.

YUNI, A. (2020) *FORMULASI DAN UJI DAYA HAMBAT SPRAY HAND SANITIZER DARI AIR
PERASAN JERUK NIPIS (Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle) TERHADAP BAKTERI
Staphylococcus aureus*. Universitas perintis Indonesia.